



CRIBADO DE LA DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA

El cribado se efectuará según la siguiente pauta:

- Maniobras de Ortolani y Barlow en periodo neonatal precoz. Se recomienda que ante una maniobra clínica positiva, el niño sea remitido a un ortopeda. El clic de cadera debe ser considerado como un hallazgo normal.
- Exploración de caderas (abducción y asimetrías) en todos los controles ulteriores de salud, hasta el año de edad.

Se realizará ecografía de caderas tras el primer mes de vida (entre las 4 y las 8 semanas) o radiografía si es mayor de 3 meses, ante una exploración clínica dudosa o anormal, o ante la presencia de marcadores de riesgo. Los marcadores de riesgo que se proponen actualmente para la indicación de una prueba de imagen incluyen la presencia de **al menos dos factores de los tres** siguientes:

- Sexo femenino.
- Parto de nalgas.
- Antecedente familiar de DEC.

En cuanto a otros marcadores de riesgo como deformidades posturales, oligoamnios, parto distócico, etc. no hay actualmente evidencia del grado de riesgo y por tanto su presencia aislada no debe conducir a la indicación de una prueba de imagen (ecografía), sino que bastaría con la exploración clínica estándar.

Javier Sánchez Ruiz-Cabello
Grupo de Trabajo Previnfad